植物分类学报 22 (6): 493—494 (1984)
Acta Phytotaxonomica Sinica

湖南的新植物*

NEW TAXA FROM HUNAN

Key words *Reevesia pubescens* var. *xuefengensis*; *Carpinus polyneura* var. *glanduloso-punctata*; var. nov.

关键词 雪峰山梭罗;密腺鹅耳枥;新变种

雪峰山梭罗 新变种 图1

Reevesia pubescens Mast. var. **xuefengensis** C. J. Qi, var. nov.

Foliis oblongo-ovatis, 12—19cm longis, 6—8cm latis, basi leviter cordatis vel truncatis,



图1 雪峰山梭罗 *Reevesia pubescens* Mast. var. *xuefengensis* C. J. Qi 1. 果枝 fruiting branch; 2. 果瓣 valve of capsule; 3. 种子 seed; 4. 花 flower; 5. 花瓣 petal; 6. 雌雄蕊柱 gynostemium; 7. 子房 ovary.



图2 密腺鹅耳枥 *Carpinus polyneura* Franch. var. *glanduloso-punctata* C. J. Qi 1. 果枝 fruiting branch; 2. 果苞 bract; 3. 果苞 fruit. (周瑜芳绘)

* 本文承蒙徐祥浩和李沛琼二位先生帮助,一并致谢。

subtus laxe pubescentibus vel glabris, floribus minoribus, petalis vix 5mm longis, androgynophoro 1.2—1.5cm longo a var. *pubescenti* facile distincta.

Hunan (湖南): Dongkou (洞口), Naxi (那溪), alt. 770m, in valley, 2 Aug. 1982, Yang Ze-yong (杨泽永) 8201 (Typus, CSFI; Isotypus, PE), 510 (fruit); Shaoyang (邵阳), Yang Shou-hua (杨受华) S-01 (fruit).

与原变种的区别在于叶长卵形，长 12—19 厘米，宽 6—8 厘米，基部微心形或截形，下面被疏柔毛或无毛，花全形较小，花瓣长仅 5 毫米，雌雄蕊柄长 1.2—1.5 厘米。

密腺鹅耳枥 新变种 图 2

Carpinus polyneura Franch. var. **glanduloso-punctata** C. J. Qi, var. nov.

A var. *polyneura* et aliis varietatibus foliorum nervis lateralibus 15—16 utrinque, serraturis acutis, obscure aristatis, bracteis fructiferis majoribus, semiellipticis vel semiovatis, 2—2.2cm longis 0.8—1cm latis, margine externo denticulatis, margine interno integris, fructibus ovato-rotundatis, dense glanduloso-punctis differt.

Hunan (湖南): Ningxiang (宁乡), alt. 200m, on hillside, 10 Oct. 1982, Xiao Yu-tan (肖育檀) 40004 (Typus, CSFI; Isotypus, PE)。

与原变种及其它变种的区别在于叶侧脉 15—16 对，锯齿尖锐，芒尖不明显，果苞较大，半椭圆形或半卵形，长 2—2.2 厘米，宽 0.8—1 厘米，外缘具浅锯齿，内缘全缘，果卵圆形，密被树脂腺体。

祁承经(中南林学院) Qi Cheng-jing(Central south Forestry Institute, China)

更 正

页、 行	误	正
第 297 页第 1 行	引 种	31 种
第 297 页第 3 行、21 行 第 298 页第 15 行、17 行、27 行、37 行 第 299 页第 10 行	玖红百合	玫红百合